

【 予防接種を受けた後の一般的注意事項 】

- 接種部位が痛む、硬くなる、赤く腫れる、だるいなどの軽い症状が接種後24時間以内に発症することがありますが、2～3日中には消失します。
- 接種後30分は、急な副反応がおきることがあります。
会場の建物内で様子をみて、医師（医療機関）とすぐ連絡がとれるようにして下さい。
- 接種後24時間は体調の変化に気をつけ、高熱、けいれん、しびれ、息苦しい、繰り返す嘔吐、強度の下痢などがあれば、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 接種当日は、大量の飲酒、激しい運動、過労、睡眠不足は避けて下さい。
- 接種当日の入浴はさしつかえありませんが、注射部位を強くこすらないで下さい。

※ 体調に変化があった場合は、会場の医師にご相談下さい。

■令和6年度(2024年)インフルエンザHAワクチン製造株

A型株 修正未

A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)

A/カリフォルニア/122/2022(SAN-022)(H3N2)

B型株 修正未

B/プーケット/3073/2013(山形系統)

B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)

【 会場の接種受付時間以外 】

◎ 体調に関するお問い合わせ

医療法人財団 綜友会 看護科 大川

電話：03-3200-1540

お問い合わせ時間 月～金曜日 9：00～16：00

（お問合せ後、看護師より折り返しの電話となる場合があります）

※ 上記の時間帯以外は、お近くの病院へご相談下さい

※ その他のお問合せは、事業所のご担当者様へご連絡下さい

医療法人財団 綜友会
新宿区西早稲田2-20-15
電話：03-3200-1540